

Фонд оценочных средств
для подготовки к государственной итоговой аттестации
по специальности ординатуры «Общая врачебная практика (семейная медицина)».

Тестовые задания

Укажите один правильный ответ

001	ДЛЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЯЗВЫ В 12-ПЕРСТНОЙ КИШКЕ ХАРАКТЕРНЫ
	боли в эпигастрии сразу после еды
Б	ночная голодная боль в эпигастрии
В	анорексия
Г	падение массы тела
002	ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НЕОБХОДИМО:
А	попытаться консервативными методами разрешить непроходимость
Б	экстренно направить больного в хирургический стационар сантранспортом
В	направить больного на обследование в терапевтический стационар для уточнения причин непроходимости
003	ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОНЬЮНКТИВИТОВ ХАРАКТЕРНА ИНЪЕКЦИЯ КОНЬЮНКТИВЫ
А	перикорнеальная
Б	конъюнктивальная
В	смешенная
Г	отсутствие инъекции
Д	застойная
004	ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР КАСЛА ОБРАЗУЕТСЯ В
А	фундальной области желудка
Б	двенадцатиперстной кишке
В	сыворотке крови
Г	стенке тонкого кишечника
005	МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
А	приподнять ножной конец кровати
Б	приподнять головной конец кровати
В	не допускать позы пациента с согнутыми коленями, скрещенными ногами
Г	каждые 2 часа в течение 5 мин выполнять пассивные движения в голеностопных суставах
Д	через каждые 20 минут выполнять пассивные движения в голеностопных суставах
006	БОЛЬ В ЭПИГАСТРИИ СПУСТЯ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ, НАТОЩАК, НОЧЬЮ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

А	язвенной болезни желудка
Б	язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
В	рака желудка
Г	стеноза привратника
007	ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
А	прием таблетированных препаратов
Б	лазеркоагуляция сетчатки
В	витрео-ретиальная хирургия
Г	интравитреальные инъекции люцентиса
Д	физиотерапевтические методы
008	ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ БОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ
А	наркотические анальгетики
Б	нпвп и миорелаксанты
В	антидепрессанты
Г	ненаркотические анальгетики
Д	транквилизаторы
009	ПРИ ОПТИЧЕСКИХ НЕВРИТАХ НАБЛЮДАЕТСЯ
А	резкое снижение зрения, гиперемия и отек дзн и кровоизлияния в сетчатку и зн
Б	светобоязнь, слезотечения
В	отсутствие снижения зрения
Г	покраснение глазного яблока, птоз
Д	нарушение подвижности глазного яблока
010	ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА НАЗНАЧАЮТСЯ
А	до нормализации гемоглобина, 2 недели для депо железа и далее курсами
Б	длительно, в течение 4-5 месяцев
В	сроком на 1 месяц
Г	на срок 1-2 недели
011	ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А	молодой возраст и женский пол
Б	повышение массы тела
В	длительные ортостатические нагрузки
Г	мужской пол и пожилой возраст
Д	плоскостопие
012	ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ
А	нестероидные противовоспалительные средства
Б	антидепрессанты
В	миорелаксанты
Г	анальгетические ненаркотические средства
Д	антиконвульсанты, антидепрессанты

013	С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ HELICOBACTER PYLORI В СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А	эндоскопия высокого разрешения
Б	хромоскопия
В	уреазный дыхательный тест
Г	бактериоскопия кала
014	ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИСТУПА МИГРЕНИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ
А	а-адреноблокаторов
Б	б-адреноблокаторов
В	б-адреноблокаторов; антиконвульсантов
Г	антисеротониновых препаратов
Д	нестероидных противовоспалительных препаратов; антиконвульсантов
015	ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ФУНИКУЛЯРНОГО МИЕЛОЗА
А	нарушение метаболизма метилмалоновой кислоты
Б	дефицит фолиевой кислоты
В	повышенная продукция арахидоновой кислоты
Г	недостаток янтарной кислоты
016	ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А	ревматоидный артрит и системная красная волчанка
Б	пролапс митрального клапана и дилатационная кардиомиопатия
В	холецистит и долихосигма
Г	нефроптоз и пиелонефрит
Д	миопия
017	СУТОЧНАЯ АБСОРБЦИЯ ЖЕЛЕЗА В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ
А	1,5-2мг
Б	15-20мг
В	25-50мг
Г	5-10мг
018	ТРАВМАТИЧЕСКАЯ КАТАРАКТА БЕЗ ЯВЛЕНИЙ НАБУХАНИЯ И ИРИДОЦИКЛИТА ДОЛЖНА ОПЕРИРОВАТЬСЯ
А	по неотложным показаниям в процессе первичной хирургической обработки
Б	через 3-7 дней после травмы
В	через 2-4 недели после травмы
Г	через 8-12 месяцев после травмы
Д	лучше решать вопрос в каждом случае индивидуально
019	КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
А	первые сутки
Б	4-7 суток
В	3 недели
Г	3-6 часов
Д	12 часов

020	ВЕДУЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ
А	боль в грудной клетке
Б	лихорадка
В	одышка
Г	слабость
021	МЕХАНИЗМ ЖЕЛТУШНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ МЕГАЛОБЛАСТИЧЕСКИХ АНЕМИЯХ
А	образование непрямого билирубина при гемолизе эритроцитов
Б	поражение печени
В	холестаз
Г	поражение почек
022	КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А	варикозное расширение поверхностных вен
Б	ощущения тяжести и повышенной утомляемости в ногах, нарастающие к вечеру
В	ощущения тяжести и повышенной утомляемости в ногах по утрам
Г	отек дистальных отделов нижних конечностей
023	ПРИ НЕВРИТЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ЦВЕТ ДИСКА
А	не меняется
Б	гиперимирован
В	бледный
Г	восковидный
Д	серый
024	ПЕРФОРАЦИЮ ЯЗВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТ
А	рентгенологически определяемый газ под правым куполом диафрагмы
Б	острые боли внизу живота
В	повышение артериального давления
Г	повышение температуры
025	ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЦВЗ ЯВЛЯЕТСЯ
А	блокаторы кальциевых каналов
Б	бета-адреноблокаторы
В	ингибиторы апф
Г	антидепрессанты
Д	диуретики
026	В ОРГАНИЗМЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
А	содержится 4-5 г железа
Б	содержится 2-5 г железа
В	содержится 10-12 г железа
Г	содержится 25-30 г железа

027	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРЕЗ ЛЕВОЙ РУКИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА
А	в среднем отделе передней центральной извилины справа
Б	в верхних отделах передней центральной извилины слева
В	в нижних отделах передней центральной извилины слева
Г	в заднем бедре внутренней капсулы
028	АБСОЛЮТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛОВИЕМ И ПОКАЗАНИЕМ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТ ЯВЛЯЕТСЯ
А	зрелая катаракта
Б	начальная катаракта
В	невозможность выполнения больным своей обычной работы
Г	передняя катаракта без гипертензии
029	СПАСТИЧЕСКИЙ ГЕМИПАРЕЗ — ЭТО НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В
А	руке и ноге с одной стороны
Б	одной ноге
В	одной руке
Г	обеих ногах
030	ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ БРОНХИОЛИТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ
А	аденовирусная инфекция
Б	корь
В	коклюш
Г	респираторно-синтициальная инфекция (рsv)
031	ОСЛОЖНЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ С ЧАСТОЙ РВОТОЙ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
А	пилородуоденальный стеноз
Б	малигнизация
В	кровотечение
Г	перивисцерит
032	ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А	консервативная терапия
Б	оперативное лечение
В	оперативное лечение с помощью ультразвука
Г	лазерное лечение
Д	физиотерапевтическое лечение
033	ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А	ожирение и избыточная масса тела
Б	малоподвижный образ жизни
В	хронические запоры
Г	применение гормональных препаратов
Д	частые падения
034	ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В МИЕЛОГРАММЕ

А	мегалобластический тип кроветворения
Б	бластов более 30 %
В	угнетение всех ростков кроветворения
Г	преобладание клеток эритроидного ряда
035	ДИАГНОЗ ХНМК МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ
А	характерных жалоб у пациента старше 65 лет
Б	результатов дуплексного сканирования маг
В	результатов мрт
Г	комплексного обследования и проведения дифференциальной диагностики
Д	результатов неврологического и нейропсихологического обследования
036	К КЛЕТКАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НЕ ОТНОСЯТСЯ
А	т-лимфоциты
Б	в-лимфоциты
В	плазматические клетки
Г	эритроциты
037	ВЫЯВЛЕННАЯ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ЖЕЛУДКА ПЛОСКАЯ НИША В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА, 2,5 СМ В ДИАМЕТРЕ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С ОБШИРНОЙ АПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ ВОКРУГ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА
А	для неосложненной язвы
Б	для пенетрирующей язвы
В	для рака желудка
Г	для дивертикула желудка
038	В ОСНОВЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
А	варикозная болезнь
Б	артериальная гипертензия
В	посттромбофлебитическая болезнь
Г	остеоартрит
Д	врожденные пороки развития вен нижних конечностей
039	ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ АНЕМИИ СВЯЗАНЫ С
А	гипоксемией
Б	интоксикацией
В	мальабсорбцией
Г	нарушением водно-электролитного баланса
040	ОСТРЫЙ ПРИСТУП ГЛАУКОМЫ НУЖНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
А	конъюнктивитом
Б	хориоретинитом
В	иридоциклитом

Г	кератитом
041	МЕНИНГИАЛЬНЫЙ СИМПТОМ — ЭТО
А	ригидность мышц затылка
Б	симптом «свисающей головы»
В	симптом бабинского
Г	симптом чуралева
042	В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РФ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАУКИ, ИЗУЧАЮЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ
А	социальная гигиена и организация здравоохранения
Б	социальная гигиена
В	общественное здоровье и здравоохранение социальная медицина
Г	профилактическая медицина
043	ДЛЯ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ
А	утрата сознания
Б	зрачковые расстройства
В	нистагм
Г	менингеальный синдром
044	ОТРАЖЕННЫЕ (ИРРАДИИРУЮЩИЕ, РЕФЕРЕНТНЫЕ) БОЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ
А	поражении органов, получающих иннервацию из одного сегмента спинного мозга
Б	поражении тканей, формирующих брюшную стенку
В	возбуждении рецепторов париетальной брюшины
Г	раздражении рецепторов стенок полых органов желудочно-кишечного тракта (спазм, перерастяжение)
045	КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ТРЕМОРА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
А	кинетический
Б	интенционный

В	покоя
Г	постуральный
046	ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ
А	показатели заболеваемости
Б	показатели инвалидности
В	показатели физического развития
Г	демографические показатели
047	ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ХАРАКТЕРНО
А	появление отёка во второй половине дня, ближе к вечеру
Б	локализация отёка в околослужечной зоне и нижней трети голени
В	исчезновение отёка после ночного отдыха
Г	двустороннее поражение
048	ОБЩЕЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ И ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМ
А	прогрессивное ухудшение оттока жидкости из глаза
Б	сужение зрачка
В	развитие глаукоматозной атрофии зрительного нерва
Г	увеличение пигментации угла передней камеры
Д	выбухание прикорневой части радужки
049	ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ, КРОМЕ
А	адекватная коррекция гликемии
Б	витаминотерапия
В	антиоксидантная терапия
Г	вазоактивная терапия
Д	противоотёчная терапия
050	НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛЕЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ

А	абсцесс брюшной полости
Б	дивертикулит
В	перфорация дивертикула
Г	толстокишечная непроходимость
Д	заворот сигмовидной кишки
051	ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕГАЛОБЛАСТНЫХ АНЕМИЙ
А	дефицит железа
Б	дефицит цианокобаламина и/или фолатов
В	дефицит тиамин
Г	дефицит рибофлавина
052	ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОТОРНЫХ ПРОБ НАЗЫВАЕТСЯ
А	гипокинезия
Б	брадикинезия
В	олигокинезия
Г	общая заторможенно
053	АКТИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ
А	гамма-глобулином
Б	анатоксином
В	живой вирусной вакциной
Г	инактивированной вирусной вакциной
054	НА КАКИЕ СРОКИ ОБЫЧНО НАЗНАЧАЕТСЯ КУРС АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА?
А	2 недели
Б	4 недели
В	6 недель
Г	8 недель

Д	12 недель
055	РЕАНИМАЦИЯ ПОКАЗАНА:
А	в каждом случае смерти больного
Б	только при внезапной смерти молодых больных и детей
В	при внезапно развившихся терминальных состояниях
056	СИМПТОМ «ОСТРОГО ЖИВОТА»
А	положительный симптом ортнера
Б	положительный симптом мерфи
В	асцит
Г	положительный симптом щеткина-блюмберга
057	СТАДИЯ ГЛАУКОМЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
А	острота зрения
Б	состоянию поля зрения
В	отношению э/д (отношение экскавации к диску зн)
Г	по величине легкости оттока
Д	коэффициенту беккера
058	СОМАТОГЕННЫЕ ОБМОРОКИ ВКЛЮЧАЮТ РАЗНОВИДНОСТЬ
А	дроп атаки
Б	кардиогенные
В	с-м унтерхарншайдта
Г	вазопрессорные
Д	ситуационные
059	НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДИАГНОЗ ПЕРНИЦИОЗНОЙ АНЕМИИ
А	ахлоргидрия
Б	положительная проба шиллинга

В	характерная гематологическая картина (макроцитоз, гиперсегментация ядер нейтрофилов)
Г	эффект от пробной терапии цианкобаламином
060	ЭТИОЛОГИЯ ЭПИЛЕПСИИ ВКЛЮЧАЕТ
А	наследственные факторы
Б	токсическое поражение
В	сосудистые факторы
Г	факторы повреждения головного мозга и наследственные причины
Д	опухоли и травмы головного мозга
061	ДЛЯ КЕРАТИТОВ ХАРАКТЕРНО
А	повышенное внутриглазное давление
Б	снижение тактильной чувствительности роговицы
В	наличие инфильтратов роговицы
Г	васкуляризация роговицы
Д	перикорнеальная или смешанная инъекция
062	ХАРАКТЕР И ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ ПРИ ПЕРФОРАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
А	постоянная, сильная, в правой подвздошной области
Б	постоянная, резкая, в правом подреберье
В	опоясывающая, тупого характера
063	ВДУВАНИЕ ВОЗДУХА И СЖАТИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ ОДНИМ РЕАНИМАТОРОМ, ПРОВОДЯТСЯ В СООТНОШЕНИИ:
А	2 : 30
Б	1 : 4-5
В	1 : 15
Г	2 : 10-12
064	ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
А	секрецию желудочной слизи и бикарбонатов

Б	секрецию пепсиногена
В	продукцию провоспалительных цитокинов
Г	активное воспаление слизистой оболочки
065	БОЛЕВОЙ СИМПТОМ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
А	пастернацкого
Б	бабинского
В	мерфи
Г	образцова
066	ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ
А	сосудистая терапия
Б	хирургическое лечение
В	антиэпилептическая терапия
Г	кетогенная диета
Д	стимуляция вагусного нерва
067	ПРИЧИНА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ
А	имевшийся ранее латентный дефицит железа
Б	многоплодная беременность
В	увеличение объема жидкости
Г	несовместимость с мужем по системе аво
068	ПРИ ХАЛАЗИОНЕ ВЕКА НЕОБХОДИМО
А	проводить лечение токами увч
Б	электрофорез
В	ввести кеналог в патологический очаг или провести хирургическое лечение
Г	проводить инстилляциии дезинфицирующих капель
Д	заложить гидрокортизоновую мазь

069	ПОСТОЯННЫЙ СИМПТОМОМ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А	спленомегалия
Б	интермитирующая лихорадка
В	общая слабость
Г	кровоточивость слизистой оболочки носа
070	ДЛЯ АНЕМИЙ С НАРУШЕНИЕМ ЭРИТРОПОЭЗА ХАРАКТЕРНО
А	увеличение количества ретикулоцитов
Б	нормальное или пониженное количество ретикулоцитов
В	снижение количества эритроцитов
Г	относительный лимфоцитоз
071	ОСНОВНОЙ СИМПТОМ МИАСТЕНИИ
А	мышечная утомляемость
Б	тремор кистей
В	головная боль
Г	судороги
072	СРЕДИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЛИДИРУЮТ
А	образ жизни
Б	экологические
В	биологические
Г	уровень организации медицинской помощи
Д	качество медицинской помощи
073	САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ У МУЖЧИН
А	кровопотеря из желудочно-кишечного тракта
Б	гломерулы опухоли
В	алкогольный гепатит

Г	гематурическая форма гломерулонефрита
074	НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У МУЖЧИН
А	алкоголизм
Б	травма живота
В	применение кортикостероидов
Г	хронический холецистит
075	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕАТОГЕПАТИТА
А	гепатопротекторы
Б	омепразол
В	сукральфат
Г	мотилиум
076	СИМПТОМ САЛЮКСА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ
А	гипертонической болезни
Б	сахарном диабете
В	заболеваниях иммунной системы
Г	заболеваниях крови
077	ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО
А	тремор кистей
Б	умственная деградация
В	нарушение координации
Г	параличи конечностей
078	ГРИБКОВОМУ ПОРАЖЕНИЮ ГЛАЗ СПОСОБСТВУЕТ
А	длительная антибиотикотерапия
Б	лечение стероидами
В	нарушение обмена веществ
079	ХАРАКТЕРНАЯ ЖАЛОБА БОЛЬНОГО С В 12 –ДЕФИЦИТНОЙ
А	жжение языка
Б	хромота
В	боли за грудиной
Г	близорукость
080	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОЙ ЯЗВЫ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЮТСЯ
А	в анамнезе прием аспирина или кортикостероидов
Б	сильные, приступообразные сезонные боли в эпигастрии
В	рвота пищей, приносящая облегчение
Г	пожилой возраст больного
081	АУРА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

А	эпилепсии
Б	геморрагического инсульта
В	менингита
Г	энцефалита
082	ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ КРОВОПОТЕРЯ, ДЕФИЦИТ НУТРИТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРУШЕНИЕ (УГНЕТЕНИЕ) ЭРИТРОПОЭЗА
А	острая и хроническая кровопотеря, гемолиз и нарушение (угнетение) эритропоэза
Б	острая и хроническая кровопотеря, дефицит нутритивных веществ и нарушение (угнетение) эритропоэза
В	острая и хроническая кровопотеря, наследственная патология цепей гемоглобинов, мембранопатии и дефицит нутритивных веществ
Г	дефицит нутритивных веществ (железо, витамин в12 и др.), гемолиз и иммуноопосредованные анемии
083	ФОРМАМИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЮТСЯ
А	«сухая» или дегенеративная
Б	геморрагическая
В	«влажная» или трансудативная
Г	воспалительная
084	СИМПТОМ БАБИНСКОГО ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
А	патологических разгибательных рефлексов
Б	сухожильных рефлексов
В	защитных рефлексов
Г	патологических сгибательных рефлексов
085	АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ
А	дает картину "бульбужников"
Б	обнаруживается желатинозный лимбальный инфильтрат
В	возникает интенсивный зуд
Г	купируется инстилляциями стероидов
Д	повышение температуры
086	БОЛЬНОГО В 12 –ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ
А	всю жизнь
Б	до нормализации уровня гемоглобина
В	1 год
Г	3 месяца
087	ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА КРОВОТОЧАЩЕЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
А	фиброгастроскопию
Б	контрастную рентгеноскопию желудка
В	анализ желудочного сока на скрытую кровь
Г	анализ кала на скрытую кровь

088	КАКОЙ ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕАТОГЕПАТИТОВ ?
А	Дигестал
Б	Энзистал
В	Креон
089	ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ И ДВУСТОРОННИЕ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИ
А	стафилококковых поражениях
Б	системных заболеваниях
В	токсоплазмозе
Г	стрептококковых заболеваниях
090	УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧИНУ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
А	повышение сосудистой проницаемости
Б	поражение кожи
В	повышение давления в сосудах
Г	снижение вязкости крови
091	ПРИЗНАК ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ
А	менингеальные симптомы
Б	атаксия
В	гемипарез
Г	клеточно-белковая диссоциация в спинномозговой жидкости
092	ГЛАУКОМА – ЭТО
А	повышение внутриглазного давления
Б	нарушение оттока внутриглазной жидкости
В	развитие экскавации зрительного нерва
Г	нарушение поля зрения
093	СУБСТРАТ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА
А	эритроцит
Б	бластная клетка
В	тромбоцит
Г	моноцит
Д	эозинофил
094	НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ЭМБОЛИИ АРТЕРИЙ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
А	ишемическая болезнь сердца
Б	атеросклероз дуги аорты
В	аневризма аорты
Г	артерио-венозные свищи
095	КАК НАЗЫВАЮТСЯ НИШИ В ТКАНИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
А	крипты
Б	фолликулы

В	соединительно-тканная капсула
Г	трабекулы
096	ОСНОВНОЙ МЕТОД ДЛЯ СКРИНИНГА САХАРНОГО ДИАБЕТА
А	определение уровня гликемии перед сном
Б	исследование содержания глюкозы в ушной сере
В	определение гликемии натощак в венозной плазме
Г	определение гликозилированного гемоглобина
Д	определение фруктозамина
097	К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЯМ ПЕЧЕНИ НЕ ОТНОСИТСЯ
А	гранулематозный гепатит
Б	опухоли печени
В	первичный билиарный цирроз печени
Г	стеатогепатит
098	ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ «ЗАСТОЙНОГО ДИСКА» ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ЯВЛЯЮТСЯ
А	повышение внутриглазного давления
Б	повышение внутричерепного давления
В	повышение артериального давления
099	ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ БОЛЬНОМУ ПРИДАЮТ
А	сидячее положение с наклоненной вниз головой
Б	горизонтальное положение
В	сидячее положение с запрокинутой назад головой
Г	сидячее положение головы с ровным положением головы
100	ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПРИ АНЕМИЯХ
А	слабость, головокружение
Б	бедность кожных покровов и видимых слизистых
В	одышка и сердцебиение
Г	боли в правом подреберье